




Din adrenalinpenna för akut behandling av anafylaxi

Emerade är din livförsäkring vid anafylaxi

Emerade är en adrenalinpenna för akut behandling av anafylaxi (allergisk chock). Anafylaxi kan man få av insektsstick, födoämnen eller läkemedel. Den kan också utlösas av ansträngning eller ha okänd orsak. Emerade motverkar symtomen vid en anafylaxi.



Ta bort nålskyddet



Tryck mot låret och ett klick hörs. Håll i 5 sekunder. Massera därefter injektionsstället. Ring 112, beställ en ambulans och säg att det är anafylaxi.

Tveka inte att använda Emerade

Använd Emerade omedelbart vid tecken eller symtom på att en akut allergisk reaktion. Följ din läkares instruktioner.

Tveka inte att använda din Emerade, även om du inte är säker på om du har anafylaxi. Emerade kan rädda ditt liv.

Emerade ger en dos och kan inte återanvändas.

Det är viktigt att du läser bipacksedel, speciellt varningar och försiktighet.



Se instruktionsvideo och läs mer om anafylaxi på emerade.se.

Då använder du Emerade

Symtom på en akut allergisk reaktion kan uppträda inom några minuter efter kontakt med det allergiframkallande ämnet.

Symtom:

- Klåda, speciellt under fötterna, i händerna eller på huvudet
- Stickande känsla i munnen
- Svullnad i munnen och halsen, på läpparna och ögonen
- Klåda, rodnad eller nässelutslag var som helst på kroppen
- Yrsel, ångest, kallsvettning
- Magsmärtor, illamående och kräkning
- Andnöd eller astmasymtom
- Plötslig svaghet, blodtrycksfall, svimning
- Förvirring eller förlorat medvetande

Kritiska symtom: Det är svårt att andas, din mun och ditt svalg sväller upp, du blir plötsligt trött och yr eller du känner en stadig försämring. Om du får dessa symtom, använd då Emerade omedelbart. Ring 112 och be om ambulans.

Adrenalin motverkar blodtrycksfallet, stimulerar hjärtat och förbättrar andningen.

Bär alltid med dig Emerade om du riskerar att komma i kontakt med ämnen som du är allergisk mot.

Ny dos efter 5 till 15 minuter

Ibland är en dos av adrenalin inte tillräcklig för att helt häva en akut allergisk reaktion. Din läkare kan därför rekommendera att injektionen upprepas efter 5–15 minuter med en ny Emerade. Du rekommenderas därför att alltid ha med dig mer än en Emerade.

Rekommenderad dos

Emerade finns i tre doser: 150, 300 och 500 mikrogram. Din läkare bestämmer lämplig dos för dig.

Förvaring

Emerade tål kyla men låt den inte frysa (0°C). Förvaras i högst 25°C.

Om du har en träningspenna, förvara den separat från Emerade.

Undersök adrenalinet

Kontrollera lösningen regelbundet, genom att lyfta etiketten över visningsfönstret på adrenalinpennan, för att säkerställa att lösningen är klar och färglös. Om lösningen är missfärgad eller innehåller en fällning (partiklar), kassera pennan och kontakta läkare för att få en ny Emerade.

Enkel

Emerade har ett stort hål där nålen kommer ut och inget hål i bakänden. Du vet instinktivt vilken ände som du ska trycka mot låret.

Säker

Nålen är automatiskt skyddad efter användning.

När du flyger

Du kan ta med dig Emerade i handbagaget. För säkerhets skull kan du be din läkare att skriva under ett reseintyg. Blankett finns på emerade.se.



Beställ gratis fodral på emerade.se.



Emerade®

Emergency aid

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Fimea (www.fimea.fi) eller Medeca Pharma AB.

Medeca Pharma AB

Box 24005, 75024 Uppsala
www.emerade.se

Tel +46 18-25 85 30
www.medeca.se

Fax +46 18-24 71 53
info@medeca.se

